

Итоговое задание на тему « Психические расстройства в пожилом возрасте»

1. Распространенность психических расстройств в пожилом возрасте составляет:

- а) 40–70 %
- б) менее 40 %
- в) более 50 %
- г) 10–50 %

2. Среди НПР у пожилых большую часть занимают расстройства:

- а) когнитивной сферы
- б) ценностно-мотивационной сферы
- в) эмоциональной сферы
- г) личности

3. К последствиям нарушений памяти и внимания у пожилых относятся все, за исключением:

- а) сложности при выполнении договоренностей
- б) снижения скорости чтения
- в) сложности при выполнении простых действий в быту
- г) недостаточной концентрации внимания

4. У пожилых среди тревожных нарушений преобладают:

- а) паническое расстройство
- б) генерализованное тревожное расстройство
- в) специфические фобии
- г) посттравматическое стрессовое расстройство

5. К критериям легкого тревожного расстройства можно отнести все симптомы, за исключением:

- а) симптомов, значительно нарушающих физическое, социальное или профессиональное функционирование
- б) наличия тревожного расстройства
- в) первичной патологической тревоги, проявляющейся «неврологическими» знаками и симптомами
- г) отчетливой вегетативной симптоматики

6. К «психологическому портрету» людей пожилого возраста можно отнести все характеристики, за исключением:

- а) повышенной тревожности и склонности к страхам

- б) снижения самооценки, неуверенности в себе
- в) опасения одиночества, беспомощности
- г) угрюмости, пессимизма

7. К мероприятиям по профилактике когнитивных расстройств забота о своем здоровье должна включать все, за исключением:

- а) контроля артериального давления
- б) приема витаминов и микроэлементов
- в) измерения уровня сахара крови

8. По данным эпидемиологических исследований, уровень выявления психических заболеваний в пожилом возрасте определяется всеми факторами, за исключением:

- а) характера и тяжести психического заболевания
- б) качества жизни
- в) возраста и пола больного
- г) социальной активности больного